

GRANDES CULTURES

Envoi n° 4 du 01 mars 1995


ISSN N° 0767-5542

Blé

Stades

Une majorité de parcelles sont au stade épi 0.5 à 1.5 cm .
Certaines sont plus avancées .

Nous vous rappelons comment on détermine le stade épi 1 cm.



Régulateurs

Rappel stades d'application

PRODUIT	STADE D'APPLICATION
Type C5	fin tallage à épi 1 cm
CYCOCEL CL	mi-tallage à 1 noeud
CYTER	mi-tallage à 1 noeud
TERPAL	1 noeud à sortie dernière feuille
ETHEVERSE CERONE	1 noeud à début gonflement
MODDUS	fin redressement à 2 noeuds
SONIS	1 à 2 noeuds

- l'efficacité des régulateurs est fortement influencée par les conditions climatiques après traitement . Il est nécessaire d'avoir des températures, dans les 5-10 jours suivants l'application, d'au moins:

10° C pour les types C5 et CYCOCEL CL,

12° C pour TERPAL

14° C pour ETHEVERSE, CERONE

- une pluie dans les heures qui suivent le traitement diminue l'efficacité ,

- pour les mélanges avec des herbicides ou des fongicides, consultez les notices ou votre technicien .

Désherbage

- attention à ne plus utiliser d'isoproturon après le stade épi 1 cm .

Maladies

- *piétin-verse* : les parcelles les plus attaquées présentent jusqu'à plus de 50 % de pieds touchés . La situation dépend fortement de la parcelle (date de semis, historique...)

- *oïdium* : en général, présence de vieilles pustules sur feuilles de la base, pas de développement y compris sur variétés sensibles .

- *septoriose -rouille brune*: présence assez fréquente

- *rouille jaune* : à surveiller sur les variétés les plus sensibles comme THESEE, RECITAL, TREMIE, ROSSINI, ORQUAL

Il se confirme un risque de pression forte et précoce des maladies (septoriose, rouille brune) sauf période durable de conditions froides . Il conviendra sans doute d'avoir une première application fongicide polyvalente . Ainsi, il sera préférable de compléter une base UNIX ou prochloraz avec une triazole .

Viroses

Notre laboratoire est en mesure de réaliser à partir de début mars, des analyses virologiques pour détecter la présence éventuelle de JNO ou de virus des pieds chétifs (transmis par les cicadelles) . Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au :

42-87-76-71 (B. HUGUET ou S. SZILVASI)

Colza

- pas de captures de charançon de la tige pour l'instant .

- au niveau maladies, situation saine globalement mis à part des symptômes de phoma sur collet dans le secteur de Limours .

- pas d'intervention à prévoir .